

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名 A+AVD				28	催吐リスク	高度
ドキシソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ビンブラスチン	6mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ブレンツキシマブ ベドチン	1.2mg/kg	点滴静注	day1,15			

**備考** VBLの最高用量は10mg/body。ブレンツキシマブベドチンの最高用量は120mg/body。

レジメン名 ABVD	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名 ABVD				28	催吐リスク	高度
ブレオマイシン	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ビンブラスチン	6mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ドキシソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			

**備考** BLMの最高用量は10mg/body。VBLの最高用量は10mg/body。

レジメン名 ABVD(イメンド)	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名 ABVD(イメンド)				28	催吐リスク	高度
ブレオマイシン	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ビンブラスチン	6mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ドキシソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			

**備考** Day1: イメンド125mg、Day2-3: イメンド80mg。  
BLMの最高用量は10mg/body。VBLの最高用量は10mg/body。

レジメン名 アドセトリス	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
レジメン名 アドセトリス				21	催吐リスク	軽度
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	点滴静注	day1			

**備考** ブレンツキシマブベドチンの最高用量は180mg/body。

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名 アロキシ-ABVD				28	催吐リスク	高度
ブレオマイシン	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ビンブラスチン	6mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ドキシソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15			
<b>備考</b> BLMの最高用量は10mg/body。VBLの最高用量は10mg/body。						
レジメン名 オプジーボ(240mg/body)				14	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
<b>備考</b>						
レジメン名 オプジーボ【480mg/body】				28	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1			
<b>備考</b>						
レジメン名 キイトルーダ(200mg/body)				21	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
<b>備考</b>						
レジメン名 キイトルーダ【400mg/body】				42	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			
<b>備考</b>						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません