

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 1外科 Bev(7.5)/XELOX				21	催吐リスク	中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 Cape: 1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 1外科 XELOX				21	催吐リスク	中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	day1-14			
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 Cape: 1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 2外科 Bev(7.5)/XELOX				21	催吐リスク	中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 Cape: 1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 2外科 XELOX				21	催吐リスク	中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	day1-14			
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 Cape: 1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 3週 Bev+IRIS(CPT-11:150mg/m ² +Bev d1)				21	催吐リスク	中等度
テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 S-1:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 4週 Bev+IRIS(CPT-11:100mg/m ² +Bev d1,15)				28	催吐リスク	中等度
テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	day1-14			
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15			
イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	day1,15			
備考 S-1:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 AFL/FOLFIRI				14	催吐リスク	中等度
アフリベルセプト ベータ	4mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1			
備考						
レジメン名 BEV(5)/5FU/LV				14	催吐リスク	軽度
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1			
備考						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 BEV(5)/FOLFIRI(150)				14	催吐リスク	中等度
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 BEV(5)/FOLFIRI(180)	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 BEV(5)/FOLFIRI(180)				14	催吐リスク	中等度
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
イリノテカン	180mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 BEV(5)/FOLFOXIRI	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 BEV(5)/FOLFOXIRI				14	催吐リスク	中等度
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1			
イリノテカン	165mg/m2	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	3200mg/m2	持続静注(48時間)	day1			

備考 Day2-3: イメンド80mg 1Cap 1日1回 + DEX 2mg/回 1日2回 朝昼食後。Day4: DEX 2mg/回 1日2回 朝昼食後。

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 BEV(5)/mFOLFOX6				14	催吐リスク	中等度
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
レジメン名 Bev/SOX(TS-1/L-OHP)				21	催吐リスク	軽度
テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m2	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	130mg/m2	点滴静注	day1			

備考 S-1:1回40mg/m2を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。

レジメン名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 Bev/TFTD				28	催吐リスク	中等度
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	70mg/m2	経口	day1-5,8-12			
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15			

備考 TFTDの内服は1回35mg/m2を1日2回。Day1の夕方より開始。Day13朝分の内服で終了。

レジメン名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 BEV/XELIRI				21	催吐リスク	中等度
カペシタビン	1600mg/m2	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
イリノテカン	200mg/m2	点滴静注	day1			

備考 カペシタビン:1回800mg/m2を1日2回、Day1夕から、Day15朝に内服

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
レジメン名 Bev/ゼローダ				21	催吐リスク	軽度
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	day1-14			
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1			
備考	Cape: 1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。					
レジメン名 bi-CPT-11(150)				28	催吐リスク	中等度
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1,15			
備考						
レジメン名 C-mab/FOLFOX6(2クール目以降)				14	催吐リスク	中等度
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8			
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1			
備考						
レジメン名 C-mab単独(2クール目以降)				7	催吐リスク	最小度
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1			
備考						

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 FOLFIRI(150)				14	催吐リスク	中等度
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 FOLFIRI(180)	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1	14	催吐リスク	中等度
イリノテカン	180mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 FOLFOXIRI	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
イリノテカン	165mg/m2	点滴静注	day1	14	催吐リスク	中等度
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	3200mg/m2	持続静注(48時間)	day1			

備考 Day2-3: イメンド80mg 1Cap 1日1回 + DEX 2mg/回 1日2回 朝昼食後。Day4: DEX 2mg/回 1日2回 朝昼食後。

レジメン名 IRIS(TS-1/CPT-11:100mg/m2 d1)	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m2	経口	day1-14	21	催吐リスク	中等度
イリノテカン	100mg/m2	点滴静注	day1			

備考 S-1: 1回40mg/m2を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 IRIS(TS-1/CPT-11:125mg/m ² d1,15)				28	催吐リスク	中等度
テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	day1-14			
イリノテカン	125mg/m ²	点滴静注	day1,15			
備考 S-1:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。						
レジメン名 mFOLFOX6				14	催吐リスク	中等度
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1			
備考						
レジメン名 PER+HER(2回目以降)				21	催吐リスク	最小度
ペルツズマブ	420mg/body	点滴静注	day1			
トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1			
備考 HER2陽性大腸癌。						
レジメン名 Pmab/CPT-11				14	催吐リスク	中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1			
備考						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 Pmab/FOLFIRI				14	催吐リスク	中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
イリノテカン	150mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 Pmab/FOLFOX	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 Pmab/FOLFOX				14	催吐リスク	中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			

備考

レジメン名 Pmab単剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名 Pmab単剤				14	催吐リスク	最小度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1			

備考

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名	RAM/FOLFIRI(150)				14	催吐リスク	中等度
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1			
	レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
	イリノテカン	150mg/m2	点滴静注	day1			
	5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
	5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			
備考 RAMの忍容性が良好であれば、2回目は30分に投与時間を短縮可能。							
レジメン名	オブジーボ(240mg/body)				14	催吐リスク	最小度
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
備考 MSI-high大腸がんに適応。							
レジメン名	オブジーボ【480mg/body】				28	催吐リスク	最小度
	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1			
備考 MSI-high大腸がんに適応。							
レジメン名	オブジーボ+ヤーボイ				21	催吐リスク	最小度
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	day1			
備考 MSI-high大腸がんに適応。							

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません