

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日			
レジメン名 Atezolizumab+CBDCA+VP-16				投与間隔	21	催吐リスク
アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1			
カルボプラチン	5AUC	点滴静注	day1			
エトポシド	100mg/m2	点滴静注	day1,2,3			
備考	Day1: イメンド125mg、Day2-3: イメンド80mg。					
レジメン名 CBDCA/CPT-11				投与間隔	21	催吐リスク 高度
イリノテカン	50mg/m2	点滴静注	day1,8			
カルボプラチン	4AUC	点滴静注	day1			
備考						
レジメン名 CBDCA/VP-16				投与間隔	21	催吐リスク 高度
エトポシド	100mg/m2	点滴静注	day1,2,3			
カルボプラチン	5AUC	点滴静注	day1			
備考	Day1: イメンド125mg、Day2-3: イメンド80mg。					
レジメン名 CDDP/VP-16 イメンド				投与間隔	21	催吐リスク 高度
エトポシド	100mg/m2	点滴静注	day1,2,3			
シスプラチン	80mg/m2	点滴静注	day1			
備考	イメンド使用時のレジメン(デキサメタゾン減量)					
レジメン名 w-CPT-11(100mg/m2)				投与間隔	28	催吐リスク 中等度
イリノテカン	100mg/m2	点滴静注	day1,8,15			
備考						

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日			
レジメン名	ハイカムチン			投与間隔	21	催吐リスク	軽度
	ノギテカン	1mg/m ²	点滴静注	day1,2,3,4,5			
備考							

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません