

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
<b>レジメン名</b> 2外科 GEM/TS-1				28	催吐リスク	中等度
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,15			
テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m2	経口	day1-14			
<b>備考</b>	S-1:1回40mg/m2を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。					
<b>レジメン名</b> Durva+GEM/CDDP				21	催吐リスク	中等度
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1			
シスプラチン	25mg/m2	点滴静注	day1,8			
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,8			
<b>備考</b>	・最大8コースまで。以降はDurvalmab単剤維持療法(4週毎) ・体重30kg以下の場合は、Durvalmabは20mg/kg。					
<b>レジメン名</b> Durva維持療法				28	催吐リスク	最小度
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1			
<b>備考</b>	・Durvalmab+GEM+CDDP療法後の維持療法として使用 ・体重30kg以下の場合は、Durvalmabは20mg/kg。					
<b>レジメン名</b> GEM/CDDP/S-1併用				14	催吐リスク	中等度
シスプラチン	25mg/m2	点滴静注	day1			
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1			
テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m2	経口	day1-7			
<b>備考</b>	S-1:1回40mg/m2を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay8朝まで内服。					

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日			
レジメン名	GEM/CDDP併用			投与間隔	21	催吐リスク	中等度
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	投与日			
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	投与日			
備考							

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません