

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	21	催吐リスク	軽度
レジメン名 HER+DOC(2クール目以降)							
トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1				
ドセタキセル	70mg/m2	点滴静注	day1				
備考							
レジメン名 HER+DOC(初回用)							
トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	day1				
ドセタキセル	70mg/m2	点滴静注	day1				
備考							
レジメン名 PTX/CBDCA							中等度
パクリタキセル	175mg/m2	点滴静注	day1				
カルボプラチン	5AUC	点滴静注	day1				
備考 頭頸部領域の悪性黒色腫に適用。							
レジメン名 weekly PAC							軽度
パクリタキセル	80mg/m2	点滴静注	day1,8,15				
備考							
レジメン名 weekly PAC+Cet(2コース目以降)							軽度
セツキシマブ	250mg/m2	点滴静注	day1,8,15,22				
パクリタキセル	80mg/m2	点滴静注	day1,8,15,22				
備考							

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名 アキラルックス光免疫療法				28	催吐リスク	最小度
セツキシマブサロタロカン	640mg/m ²	点滴静注	day1			
備考	本剤投与の20-28時間後にレーザー光を照射すること。					
レジメン名 オブジーボ(240mg/body)				14	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
備考						
レジメン名 オブジーボ【480mg/body】				28	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1			
備考						
レジメン名 キイトルーダ(200mg/body)				21	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
備考						
レジメン名 キイトルーダ【400mg/body】				42	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			
備考						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません