

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	
レジメン名 3内科 GEM/TS-1				21	催吐リスク	中等度
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,8			
テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m2	経口	day1-14			
備考	S-1:1回40mg/m2を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服。					
レジメン名 FOLFIRINOX				14	催吐リスク	高度
オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
イリノテカン	180mg/m2	点滴静注	day1			
5-フルオロウラシル	400mg/m2	急速静注	day1			
5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			
備考	Day2-4:DEX 8mg/Day 1日2回 朝昼食後					
レジメン名 GEM(d1,15)				28	催吐リスク	軽度
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,15			
備考						
レジメン名 GEM(d1,8,15)				28	催吐リスク	軽度
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,8,15			
備考						

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日			
レジメン名	GEM+アブラキサン			投与間隔	28	催吐リスク	中等度
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m2	点滴静注	day1,8,15			
	ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴静注	day1,8,15			
備考							
レジメン名	mFOLFIRINOX			投与間隔	14	催吐リスク	高度
	オキサリプラチン	85mg/m2	点滴静注	day1			
	レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
	イリノテカン	150mg/m2	点滴静注	day1			
	5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			
備考 Day2-4:DEX 8mg/Day 1日2回 朝昼食後							
レジメン名	オニバイド+5-FU/LV			投与間隔	14	催吐リスク	中等度
	イリノテカン(リポソーム製剤)	70mg/m2	点滴静注	day1			
	レボホリナート	200mg/m2	点滴静注	day1			
	5-フルオロウラシル	2400mg/m2	持続静注(46時間)	day1			
備考							

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません