

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日			
レジメン名	CP(CBDCA/PTX)			投与間隔	21	催吐リスク	高度
	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	day1			
	カルボプラチン	5AUC	点滴静注	day1			
備考							
レジメン名	オブジーボ(240mg/body)			投与間隔	14	催吐リスク	最小度
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
備考							
レジメン名	オブジーボ【480mg/body】			投与間隔	28	催吐リスク	最小度
	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1			
備考							
レジメン名	キイトルーダ(200mg/body)			投与間隔	21	催吐リスク	最小度
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
備考							
レジメン名	キイトルーダ【400mg/body】			投与間隔	42	催吐リスク	最小度
	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			
備考							
レジメン名	ダカルバジン			投与間隔	21	催吐リスク	高度
	ダカルバジン	850mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 DTICは遮光して投与。							

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名 ダカルバジン イメンド				21	催吐リスク	高度
ダカルバジン	850mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 DTICは遮光して投与。。イメンド使用時のレジメン(ステロイド減量)						
レジメン名 パベンチオ				14	催吐リスク	最小度
アベルマブ	10mg/kg		day1			
備考 前投薬あり:カロナール(200) 2T,フェキソフェナジン(60) 2Tを内服。						
レジメン名 ヤーボイ				21	催吐リスク	最小度
イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	day1			
備考 投与30分前にカロナール400mg、レスタミン50mgを内服。						
レジメン名 ヤーボイ+オプジーボ(80mg/Body)併用				21	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	80mg/body	点滴静注	day1			
イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	day1			
備考 投与30分前にフェキソフェナジン(60) 2Tを内服。						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません