

◆ 急性骨髄性白血病

作成日: 2023/07/19

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 ATO(トリセノックス単剤)寛解後療法				5	催吐リスク	中等度
三酸化ヒ素	0.15mg/kg	点滴静注	day1-5			
備考 急性前骨髄球性白血病(APL)。最長4週間、計20回まで。						
レジメン名 Ven+Aza(点滴注射)				28	催吐リスク	中等度
アザシチジン	75mg/m2	点滴静注	day1,2,3,4,5,6,7			
ベネトクラクス	400mg/body	経口	day1-28			
備考 初回コースのベネトクラクス内服用量: day1 100mg、day2 200mg、day3以降 400mg 調製後1時間以内に投与終了。 外来施行時は、Aza day1-5、8-9の場合あり。(土日休日のため)						
レジメン名 Ven+Aza(皮下注射)				28	催吐リスク	中等度
アザシチジン	75mg/m2	皮下注射	day1,2,3,4,5,6,7			
ベネトクラクス	400mg/body	経口	day1-28			
備考 Aza開始30分前にカイトリル錠(1mg)2錠内服。 初回コースのベネトクラクス内服用量: day1 100mg、day2 200mg、day3以降 400mg 投与量に応じて、複数個所に分けて投与すること。投与直前に再度均一な懸濁液とすること。調製後1時間以内に投与終了。 外来施行時は、Aza day1-5、8-9の場合あり。(土日休日のため)						
レジメン名 Ven+LDAC				28	催吐リスク	軽度
シタラビン	20mg/m2	皮下注射	day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10			
ベネトクラクス	600mg/body	経口	day1-28			
備考						

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません