

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 CLL トレアキシン				28	催吐リスク	中等度
ベンダムスチン	100mg/m ²	点滴静注	day1,2			
備考						
レジメン名 CLL リツキサンのC2-6				28	催吐リスク	最小度
リツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注	day1			
備考 ベネトクラクスと併用可能。						
レジメン名 CLL_RB_C1				28	催吐リスク	中等度
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	day1			
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴静注	day2,3			
備考 ・ポララミン投与開始時にブルフェン2錠内服。 ・リツキサンは1mg/mLに調製。 ・初回: 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ上昇可(最大400mL/h) ・2回目以降で忍容性がある場合: 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ上昇可(最大400mL/h)						
レジメン名 CLL_RB_C2以降				28	催吐リスク	中等度
リツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注	day1			
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴静注	day1,2			
備考 ・ポララミン投与開始時にブルフェン2錠内服。 ・リツキサンは1mg/mLに調製。 ・初回: 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ上昇可(最大400mL/h) ・2回目以降で忍容性がある場合: 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ上昇可(最大400mL/h)						