

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Bd_サイクル1-3				21	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,4,5,8,9,11,12,15			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,8,15			
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	day1,4,8,11			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po):20mg/body (d1,2,4,5,8,9,11,12,15)</li> <li>・DARA投与1~3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> </ul>					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Bd_サイクル4-8				21	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,4,5,8,9,11,12			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1			
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	day1,4,8,11			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po):20mg/body (d1,2,4,5,8,9,11,12)</li> <li>・DARA投与1~3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> </ul>					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Bd_サイクル9-				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po):20mg/body (d1)</li> <li>・DARA投与1~3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> </ul>					

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	28	催吐リスク	軽度
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Cd_サイクル1							
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16				
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day22				
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,8,15,22				
カルフィルゾミブ	20mg/m2	点滴静注	day1,2				
カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴静注	day8,9,15,16				
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po): 20mg/body (d1,2,8,9,15,16)、40mg/body(d22)</li> <li>・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> <li>・mPSL(po): 20mg/body(d3)※遅発性IRR予防目的</li> </ul>						
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Cd_サイクル2							
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16				
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day22				
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,8,15,22				
カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴静注	day1,2,8,9,15,16				
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po): 20mg/body (d1,2,8,9,15,16)、40mg/body(d22)</li> <li>・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> </ul>						
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Cd_サイクル3-6							
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16				
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day22				
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,15				
カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴静注	day1,2,8,9,15,16				
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po): 20mg/body (d1,2,8,9,15,16)、40mg/body(d22)</li> <li>・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。</li> </ul>						

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Cd_サイクル7以降				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16			
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day22			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1			
カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,8,9,15,16			
<b>備考</b>	・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16)、40mg/body(d22) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Ld_サイクル1-2				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,8,15,22			
<b>備考</b>	・LEN(po):25mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Ld_サイクル3-6				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,15			
<b>備考</b>	・LEN(po):25mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Ld_サイクル7-				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1			
<b>備考</b>	・LEN(po):25mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Pd_サイクル1-2				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
ポマリドミド	4mg/body	経口	day1,21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,8,15,22			
<b>備考</b>	・Pom(po):4mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Pd_サイクル3-6				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
ポマリドミド	4mg/body	経口	day1,21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1,15			
<b>備考</b>	・Pom(po):4mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> Dara(sc)-Pd_サイクル7-				28	催吐リスク	軽度
デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
ポマリドミド	4mg/body	経口	day1,21			
ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	皮下注射	day1			
<b>備考</b>	・Pom(po):4mg/body(d1-21) ・DEX (po):20mg/body (d1,2,8,9,15,16,22,23) ・DARA投与1～3時間前に「レナデックス 20mg、カロナール 800mg、レスタミンコーワ30mg」を内服。					
<b>レジメン名</b> DLd_サイクル1				28	催吐リスク	軽度
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
<b>備考</b>	・DEX (po):20mg/body (d2,9,16,28) ・DARA投与60分前に「カロナール 3T,モンテルカスト 1T」を内服					

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
<b>レジメン名 DLd_サイクル2</b>				28	催吐リスク	軽度
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX (po):20mg/body (d2,9,16,28)</li> <li>・DARA投与60分前に「カロナール 3T,モンテルカスト 1T」を内服</li> </ul>					
<b>レジメン名 DLd_サイクル3-6</b>				28	催吐リスク	軽度
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	day1,15			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX(po):20mg/body(d2,8,9,16,22,23)</li> <li>・DARA投与60分前に「カロナール 3T,モンテルカスト 1T」を内服</li> </ul>					
<b>レジメン名 DLd_サイクル7以降</b>				28	催吐リスク	軽度
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	day1			
レナリドミド	25mg/body	経口	day1-21			
<b>備考</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DEX(po):20mg/body (d2,8,9,15,16,22,23)</li> <li>・DARA投与60分前に「カロナール 3T,モンテルカスト 1T」を内服</li> </ul>					
<b>レジメン名 Isa+d サイクル1</b>				28	催吐リスク	軽度
イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day1,8,15,22			
<b>備考</b>						
<b>レジメン名 Isa+d サイクル2以降</b>				28	催吐リスク	軽度
イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,15			
デキサメタゾン	40mg/body	経口	day1,8,15,22			
<b>備考</b>						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名		投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	軽度
レジメン名	Isa+Kd サイクル1				28		
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
	デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
	カルフィルゾミブ	20mg/m2	点滴静注	day1,2			
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴静注	day8,9,15,16			
備考							
レジメン名	Isa+Kd サイクル2以降				28		
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,15			
	デキサメタゾン	20mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23			
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴静注	day1,2,8,9,15,16			
備考							
レジメン名	Isa単独療法 サイクル1				28		
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22			
備考							
レジメン名	Isa単独療法 サイクル2以降				28		
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,15			
備考							

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません