

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	中等度
レジメン名 オプジーボ(240)+カボザンチニブ				14	催吐リスク	中等度
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
カボザンチニブ	40mg/body	経口	day1-14			
備考						
レジメン名 オプジーボ【480】+カボザンチニブ				28	催吐リスク	中等度
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1			
カボザンチニブ	40mg/body	経口	day1-28			
備考						
レジメン名 オプジーボ+ヤーボイ				21	催吐リスク	最小度
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1			
イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	day1			
備考						
レジメン名 キイトルーダ(200)+アキシチニブ				21	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
アキシチニブ	10mg/body	経口	day1-21			
備考 アキシチニブ5mg 1回1錠 1日2回内服(連日)						
レジメン名 キイトルーダ(200)+レンビマ				21	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
レンバチニブ	20mg/body	経口	day1-21			
備考 レンバチニブ:20mg/日 内服(連日)						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名 キイトルーダ【400】+アキシチニブ				42	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			
アキシチニブ	10mg/body	経口	day1-42			
備考 アキシチニブ5mg 1回1錠 1日2回内服(連日)						
レジメン名 キイトルーダ【400】+レンビマ				42	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			
レンバチニブ	20mg/body	経口	day1-42			
備考 レンバチニブ:20mg/日 内服(連日)						
レジメン名 パベンチオ+アキシチニブ				14	催吐リスク	最小度
アベルマブ	10mg/kg		day1			
アキシチニブ	10mg/body	経口	day1-14			
備考 前投薬:カロナール(200) 3T、レスタミン(10) 3T アキシチニブ5mg 1回1錠 1日2回内服(連日)						

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません