

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	
レジメン名 GEM/CBDCA療法				21	催吐リスク	中等度
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8			
カルボプラチン	4.5AUC	点滴静注	day1			
備考	Day1: イメンド125mg、Day2-3: イメンド80mg内服。					
レジメン名 M-VAC イメンド				28	催吐リスク	高度
メトレキサート	30mg/m ²	点滴静注	day1,15,22			
ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴静注	day2,15,22			
ドキシソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	day2			
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	day2			
備考	Day2: イメンド125mg、Day3-4: イメンド80mg内服。Day3-4にDEX8mg内服。					
レジメン名 w-GEM				21	催吐リスク	軽度
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15			
備考						
レジメン名 エンホルツマブ ベドチン				28	催吐リスク	軽度
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	点滴静注	day1,8,15			
備考						
レジメン名 キイトルーダ(200mg/body)				21	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1			
備考						

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名 キイトルーダ【400mg/body】				42	催吐リスク	最小度
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1			

備考

レジメン名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名 バベンチオ				14	催吐リスク	最小度
アベルマブ	10mg/kg		day1			

備考 前投薬あり:カロナール(200)3T+フェキソフェナジン(60)2T、適応:根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法