

| 抗がん薬名 | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 高度 |
|------------------------------------|---------------------|------|-----------|------|----|-------|-----|
| レジメン名 AP(ADR/CDDP) | | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 高度 |
| ドキシソルビシン | 60mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 Bev+オラパリブ | | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 軽度 |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | | |
| オラパリブ | 300mg/body | 内服 | day1-21 | | | | |
| 備考 オラパリブ 300mg 1日2回 | | | | | | | |
| レジメン名 Bev単剤 | | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 最小度 |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 TC(PTX+CBDCA)療法との併用後に行う。 | | | | | | | |
| レジメン名 CDDP/CPT-11 | | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 高度 |
| イリノテカン | 60mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 | | | | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 DC(DOC/CBDCA) | | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | | |
| カルボプラチン | 5AUC | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

免責事項: 本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 催吐リスク | 軽度 |
|----------------------|--------------------------|-----------|------|-----------|------|-------|-----|
| レジメン名 | DOC/GEM | | | | 21 | 催吐リスク | 軽度 |
| | ゲムシタビン | 900mg/m2 | 点滴静注 | day1,8 | | | |
| | ドセタキセル | 70mg/m2 | 点滴静注 | day8 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | Dose-dense TC(PTX/CBDCA) | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | パクリタキセル | 80mg/m2 | 点滴静注 | day1,8,15 | | | |
| | カルボプラチン | 6AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 ・レスタミン5T内服 | | | | | | | |
| レジメン名 | DP(DOC/CDDP) | | | | 21 | 催吐リスク | 高度 |
| | ドセタキセル | 70mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| | シスプラチン | 60mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | GEM/CBDCA | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | 点滴静注 | day1,8 | | | |
| | カルボプラチン | 4AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | GEM/CBDCA+Bev | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | 点滴静注 | day1,8 | | | |
| | カルボプラチン | 4AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 催吐リスク | 軽度 |
|--------------------------------|------------|------|------------|------|-------|-----|
| レジメン名 GEM単剤(d1,8,15) | | | | 28 | 催吐リスク | 軽度 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m2 | 点滴静注 | day1,8,15 | | | |
| 備考 | | | | | | |
| レジメン名 Pembro+Bev維持療法 | | | | 21 | 催吐リスク | 最小度 |
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | |
| レジメン名 Pembro+TC(PTX/CBDCA)+Bev | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| パクリタキセル | 175mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| カルボプラチン | 5AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | |
| レジメン名 Pembro+TC(PTX/CBDCA)+Bev | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| パクリタキセル | 175mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| カルボプラチン | 5AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 ・レスタミン5T内服 | | | | | | |
| レジメン名 PI療法(CDDP/IFO) | | | | 21 | 催吐リスク | 高度 |
| イホスファミド | 1500mg/m2 | 点滴静注 | day1,2,3,4 | | | |
| シスプラチン | 20mg/m2 | 点滴静注 | day1,2,3,4 | | | |
| 備考 | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 中等度 |
|---------------------|---------|------|--------------|------|----|-------|-----|
| レジメン名 PLD/CBDCA | | | | | | | |
| ドキシソルビシン(リポソーム製剤) | 30mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | | |
| カルボプラチン | 5AUC | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 PLD+Bev | | | | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 軽度 |
| ドキシソルビシン(リポソーム製剤) | 40mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | | |
| ベバシズマブ | 10mg/kg | 点滴静注 | day1,15 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 PLD+Bev_投与日変更 | | | | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 軽度 |
| ドキシソルビシン(リポソーム製剤) | 40mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | | |
| ベバシズマブ | 10mg/kg | 点滴静注 | day3,17 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 PLD単独(ドキシル) | | | | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 軽度 |
| ドキシソルビシン(リポソーム製剤) | 50mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 PTX+Bev | | | | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 軽度 |
| パクリタキセル | 80mg/m2 | 点滴静注 | day1,8,15,22 | | | | |
| ベバシズマブ | 10mg/kg | 点滴静注 | day1,15 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 催吐リスク | |
|-------|-----------------------|-----------------------|------|------------|------|-------|-----|
| レジメン名 | TC(PTX/CBDCA) | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | |
| | カルボプラチン | 6AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | TC+Bev(PTX/CBDCA/Bev) | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | |
| | カルボプラチン | 6AUC | 点滴静注 | day1 | | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | TI(THP-ADR/IFM) | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | イホスファミド | 1500mg/m ² | 点滴静注 | day1,2,3,4 | | | |
| | ピラルビシン | 40mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | TP(PTX/CDDP) | | | | 21 | 催吐リスク | 高度 |
| | パクリタキセル | 135mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | |
| | シスプラチン | 50mg/m ² | 点滴静注 | day2 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | w-CDDP | | | | 7 | 催吐リスク | 高度 |
| | シスプラチン | 40mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | 投与間隔 | 催吐リスク | 高度 |
|-------------------------|------------------------|------------|------|---------|------|-------|-----|
| レジメン名 | w-CDDP_short hydration | | | | 7 | 催吐リスク | 高度 |
| | シスプラチン | 40mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | weekly NDP療法 | | | | 7 | 催吐リスク | 中等度 |
| | ネダプラチン | 30mg/m2 | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | キイトルーダ(200)+レンビマ | | | | 21 | 催吐リスク | 最小度 |
| | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| | レンバチニブ | 20mg/body | 経口 | day1-21 | | | |
| 備考 レンバチニブ:20mg/日 内服(連日) | | | | | | | |
| レジメン名 | キイトルーダ(200)+レンビマ | | | | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
| | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| | レンバチニブ | 20mg/body | 経口 | day1-21 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | キイトルーダ【400】+レンビマ | | | | 42 | 催吐リスク | 最小度 |
| | ペムブロリズマブ | 400mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| | レンバチニブ | 20mg/body | 経口 | day1-42 | | | |
| 備考 レンバチニブ:20mg/日 内服(連日) | | | | | | | |
| レジメン名 | キイトルーダ【400】+レンビマ | | | | 42 | 催吐リスク | 中等度 |
| | ペムブロリズマブ | 400mg/body | 点滴静注 | day1 | | | |
| | レンバチニブ | 20mg/body | 経口 | day1-42 | | | |
| 備考 | | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません

| 抗がん薬名 | | 投与量 | 投与方法 | 投与日 | | | |
|---|-----------|-----------------------|------|--------------|----|-------|----|
| レジメン名 | ノギテカン+Bev | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 軽度 |
| | ノギテカン | 1.25mg/m ² | 点滴静注 | day1,2,3,4,5 | | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| レジメン名 | ノギテカン単剤 | | | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 軽度 |
| | ノギテカン | 1.5mg/m ² | 点滴静注 | day1,2,3,4,5 | | | |
| 備考 再発例では多くの場合、1段階減量(1.25mg/m ²)が必要 | | | | | | | |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません